

Waar kun je, volgens artsen, de Powerstrip™ het beste plakken?

- 1. Voorhoofdsholte ontsteking:** De streek van de frontale sinussen. (boven je neus en wenkbrauwen en beide kanten van je neus)
- 2. Neusbijholteontsteking (Sinusitis):** Symmetrisch beide kanten van de kaakholten.
- 3. (Midden)Oorontsteking (Otitis) en gehoorverlies:** Achter beide oren.
- 4. Angina:** Op je keel en onder je kin.
- 5. Loopneus / verkouden (Rhinitis):** Op de vleugels van de neus en sinussen.
- 6. Bronchitis, hoest bij rokers, stoppen met roken:** Op het borstbeen aan de voorkant en achter tussen de schouderbladen.
- 7. Hoofdpijn en migraine:** Achter het gebied van de cervicale wervelkolom. (nek en halswervels)
- 8. Hoge bloeddruk:** Een kwart Powerstrip™ op het gebied van de cervicale wervelkolom (nek en halswervels) en de rest op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
- 9. Lage bloeddruk:** Driekwart Powerstrip™ op het gebied van de cervicale wervelkolom (nek en halswervels) en de rest op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
- 10. Gezichtsvermogen verbeteren:** Op de slapen en aan de zijkant van het hoofd (temporale gebied) links en rechts.
- 11. Pijn in de hartstreek:** Halve Powerstrip™ op het borstbeen en een halve Powerstrip™ tussen de schouderbladen.
- 12. Zwaar gevoel, buikpijn, overbelasting van de maag (indigestie), slechte adem:** Halve Powerstrip™ op de maag en halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
- 13. Maag- darmstelsel (biliary dyskinesia), brandend maagzuur, galblaasaandoeningen (acalculeuze cholecystitis):** Halve Powerstrip™ op de plaats van de galblaas (net onder je lever) en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
- 14. Obstipatie, colitis (ontsteking van de dikke darm):** Halve Powerstrip™ onder de navel en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
- 15. Prostaatontsteking (prostatitis), adenoom (goedaardig gezwel):** Knip de Powerstrip™ in vier gelijke delen, plak op de binnenzijde van beide dijën 1 deel, op de onderkant van je buik 1 deel en 1 deel op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)

16. Gynaecologische problemen: Knip de Powerstrip™ in vier gelijke delen, plak 1 deel Powerstrip™ op de onderbuik, 1 deel Powerstrip™ op het heiligbeen (onderste deel van de wervelkolom), 2 delen Powerstrip™ net boven de beide enkels of op de binnenkant van de dijen.

17. Vleesbomen en cysten: Plak een halve Powerstrip™ op het gebied onder de navel en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)

18. Gewrichtsziekten: Knip de Powerstrip™ in vier gelijke stroken; het gewricht beplakken vanuit verschillende hoeken.

19. Hielspoor (felle pijn onder de hiel): Plak de Powerstrip™ op de hiel en onderbenen.

20. Spataderen: Plak de Powerstrip™ op het onderste deel van het scheenbeen.

21. Ader ontsteking (Tromboflebitis): Plak de Powerstrip™ boven de knooppunten. Mag NIET op de knooppunten.

22. Diabetes: Plak een halve Powerstrip™ in de buurt van de alveesklieer en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)

23. Allergische aandoeningen: Plak een halve Powerstrip™ op het heiligbeen, een halve Powerstrip™ in het gebied van de lever en galblaas (alleen als je geen last hebt van galstenen!) en een halve Powerstrip™ onder je linker- en rechtervoet.

24. Huidontsteking (Dermatitis), psoriasis, droge eczeem: Plak een halve Powerstrip™ op de plaats zelf en een halve Powerstrip™ op de lever. (werkt ontgiftend)

25. Drugs- en medicijn vergiftiging, na chemotherapie, bij vergiftiging algemeen: Een halve Powerstrip™ plakken onder de voeten en een halve Powerstrip™ plakken in het gebied van de lever en galblaas. (alleen als je geen last hebt van galstenen!)

26. Bloedcirculatie hersenen, verbetering geheugen, verbetering concentratie, verbetering slaap, botvormingsstoornis van de wervelkolom (osteochondrose): Plak een halve Powerstrip™ op de cervicale wervelkolom (nek en halswervels) en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)

27. Tekort aan schildklierhormonen (hypothyreoïdie): Plak een halve Powerstrip™ op het borstbeen en een halve Powerstrip™ op de zevende halswervel.

28. Stress: Plak de Powerstrip™ daar waar je stress voelt. Bijvoorbeeld; op beide schouders, op je buik, onderin je rug, op je borst, tussen je schouders etc.

Voor de meeste gevallen geldt: gebruik minimaal 3 tot 12 maanden, zodat weefsel zich goed kan herstellen, cellen zich kunnen vernieuwen en functies kunnen verbeteren.

De Powerstrip™ kan zonder enig risico lange tijd achtereen gebruikt worden.